



Автор: ГОЛОЦЕВИЧ Ж. С., врач акушер-гинеколог женской консультации УЗ "Речицкая ЦРБ"

**Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)** - это группа инфекционных болезней, которую объединяет преимущественно половой путь передачи. К ним относятся, также и венерические болезни. Венерическими они названы по имени Венеры - мифологической богини любви и красоты. Но ничего общего с любовью, тем более с красотой они не имеют. Скорее эти болезни связаны с отсутствием всяких представлений о любви и красоте.

Возбудителями инфекций передаваемых половым путем являются патогенные микроорганизмы - бактерии, вирусы, простейшие.

Существуют более 20 болезней, которые могут передаваться половым путем, например, хламидийная инфекция мочеполовых органов, трихомоноз, генитальный герпес, остроконечные кондиломы, уреаплазмоз, микоплазмоз, мочеполовой кандидоз, папилломовирусная инфекция, сифилис, гонорея и др. При половых контактах возможно также заражение такими паразитарными болезнями, как чесотка и лобковый педикулез.

Одно из самых грозных заболеваний человечества ВИЧ-инфекция, также, в настоящее время передаётся преимущественно половым путём (за 2010 г около 70% случаев инфицирования при половых контактах).

Следует отметить нарастающее число всех зарегистрированных инфекций мочеполового тракта по Республике Беларусь за последние 2 года. Отмечается рост заболеваемости генитальным герпесом, микоплазмозами, кандидозом, бактериальным вагинозом, воспалительными заболеваниями мочеполовых органов, вызванных уреаплазмой.

Присутствие половой инфекции в организме зачастую никак себя не проявляет, т.е. ИП ПП протекают чаще малосимптомно и даже, порой совсем бессимптомно, а проявляться начинают при обострении воспалительного процесса.

В этом случае могут появляться следующие признаки ИППП:

- Выделения из мочеиспускательного канала у мужчин, необычные выделения из влагалища у женщин - обильные, желтоватого цвета, либо творожистые, сопровождающиеся запахом;
- Кровянистые выделения из влагалища у женщин в период между менструациями;
- Боли внизу живота, в области поясницы у женщин; у мужчин - в области яичек;

- Болезненные ощущения во время полового акта;
- Язвочки, пузырьки, эрозии на половых органах, в области заднего прохода, в полости рта;
- Разрастания в области половых органов, заднего прохода;

Наличие указанных симптомов, особенно если они появились после случайной половой связи, является веским основанием для обращения к врачу. Это может быть акушер-гинеколог, уролог или дерматовенеролог.

Перечисленные симптомы могут уменьшаться или вовсе исчезнуть через некоторое время при отсутствии лечения. Однако это говорит не о выздоровлении, а, как правило, о переходе болезни в хроническую форму, которая время от времени обостряется.

**Несвоевременно начатое лечение ИППП приводит к тяжелым последствиям и осложнениям** - развитию хронических воспалительных процессов половых органов, что в свою очередь является причиной снижения потенции у мужчин, выкидышей, Преждевременных родов, внематочной беременности, бесплодия у женщин, пороков развития у детей, а также злокачественных заболеваний половых органов.

И помните, что, при появлении выше указанных симптомов не стоит заниматься самолечением

бесконтрольным приёмом антибиотиков, а следует обратиться к врачу, поскольку неправильный нерациональный приём антибиотиков не только бесполезен, но порою даже опасен, кроме того развивается устойчивость микроба к антибиотикам, что в дальнейшем создаёт трудности в лечении этих заболеваний даже высококвалифицированными специалистами.

Самый надежный способ предупреждения ИППП - супружеская верность, основой которой является взаимная любовь, уважение. Раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, случайные половые контакты без использования средств индивидуальной профилактики являются факторами повышенного риска заражения ИППП.

**Будьте здоровы!** ☐