Автор: Главный врач Речицкого зонального ЦГЭ В.М.Поднесенский



Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться сложной и напряженной.

По данным официальной статистики в Республике Беларусь на 01.07.2013г. зарегистрировано 14913 случаев ВИЧ-инфекции.

По-прежнему, Гомельская область занимает лидирующее положение. Всего в области зарегистрировано 7225 случаев ВИЧ-инфекции (48,4% от всех случаев в РБ).

В эпидемический процесс вовлечены все административные районы области.

Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в следующих районах: Светлогорский – 3309, Жлобинский – 1168, г.Гомель – 905, Речицкий – 432, г.Мозырь – 297, Калинковичский – 274, Октябрьский – 230, Гомельский – 139. В остальных районах от 11 до 70 случаев.

С момента регистрации ВИЧ-положительных с 1996 года и по состоянию на 01.07.2013г. в Речицком районе зарегистрировано 432 ВИЧ-положительных.

Из числа зарегистрированных 346 (80,3%) – жители города Речицы и 86 (19,7%) человека – жители сельской местности. В структуре заболеваемости 259 мужчин (60%) и 173 женщины (40%). Путем заражения явились: инъекционное введение наркотических веществ – 46,1% (199 человек), половой – 52,5% (227 человек), в 1 случае (0,2%) путь передачи не установлен, в 4 случаях (1,0%) – вертикальным путем, 1 случай (0,2%) – нанесение татуировки нестерильным инструментарием.

В возрастной структуре заболеваемость распределяется: до 30 лет – 224 человека (51,9%), старше 30 лет – 208 человека (48,1%).

В структуре заболеваемости по социальному статусу: 266 чел. (61,6%) без определенного рода деятельности; 99 чел. (22,9%) рабочих и служащих.

В Речицком районе за январь-июнь 2013 года выявлено 20 новых случаев ВИЧ-инфекции (2012 год – 18), отмечается рост на 11,1%.

В структуре инфицированных ВИЧ: 12 мужчин (60%) и 8 женщин (40%).

В возрастной группе до 19 лет – 1 (5%), 20-24 года – 2 (10%), 30-34 года – 3 (15%), 35-39 лет – 4 (20%), 40-44 года – 5 (25%), 45-49 лет – 3 (15%), 50-54 года – 2 (10%).

Преобладающим остается половой путь передачи: 18 человек (90%), инъекционные наркотики – 1 (5%), нанесение татуировки – 1 (5%).

Городских жителей – 15 (75%), сельских – 5 (25%).

По социальному статусу: 12 (60%) – не работают, 7 (35%) – работающие, 1 (5%) – учащийся.

Всего в Речицком районе выявлено 4 ВИЧ-положительных ребенка, случаев ВИЧ-инфекции среди детей в 2010-2011 годах не регистрировалось, в 2012 году – 1, в 2013 году – не регистрировалось.

В 2009-2010 годах аварийных ситуаций не регистрировалось (2008 год – 6 аварийных ситуаций), в 2011 году – 1 случай, за 2012 год – 3 случая, 2013 год – 1 случай.

Диагноз СПИД, пре-СПИД по состоянию на 01.07.2013г. установлен у 132 человек, что составляет 30,6% от числа зарегистрированных по Речицкому району. За январь-июнь 2013 года – 15 человек.

Число умерших по состоянию на 01.07.2013г. составляет 109 человек, что составляет 25,2% от всех зарегистрированных по Речицкому району. За январь-июнь 2013 – 9 человек.

Сегодня заразиться ВИЧ рискует каждый.

Вирус иммунодефицита человека, попадая в организм, начинает разрушать иммунную систему.

СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, которая наступает через 8-10 лет, когда иммунная система разрушена, организм не может защищаться от болезней и человек умирает.

Пока же этого не произошло, человек чувствует себя хорошо, выглядит здоровым и может даже не подозревать, что у него ВИЧ, а, следовательно, передавать вирус другим людям.

Лекарство от ВИЧ-инфекции не найдено. Диагноз можно установить только по результатам лабораторного обследования.

ВИЧ передается тремя путями:

- парентеральный (через кровь): человек может заразиться, используя нестерильные иглы, шприцы при инъекциях лекарственных средств, введении наркотиков, при непрофессиональном пирсинге, татуировках и т.д.;

- половой: заражение происходит при половом контакте (большое количеств вируса содержится в сперме и влагалищных выделениях);

- вертикальный (от матери к ребенку): ВИЧ-инфицированная женщина может передать инфекцию ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Как защитить себя?

Главное – позаботиться о том, чтобы в организм не попала инфицированная жидкость другого человека (кровь, сперма, влагалищные выделения):

- используйте стерильные инструменты при любых медицинских и косметических процедурах;

- откажитесь от употребления наркотиков;

- используйте презерватив при половых контактах, ведь до того как вы встретились, у Вас или Вашего партнера, возможно, была другая жизнь;

- если есть подозрения, обследуйтесь на ВИЧ, пройти обследование на ВИЧ можно в любой поликлинике по месту жительства бесплатно.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на интерактивном веб-сайте по проблеме ВИЧ/СПИД www.aids.by