

Автор: В.М.Поднесенский, главный санитарный врач Речицкого ЗЦГЭ



**Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться сложной и напряженной.**

**По данным официальной статистики в Республике Беларусь на 01.04.2014г. зарегистрировано 16169 случаев ВИЧ-инфекции.**

По-прежнему, Гомельская область занимает лидирующее положение. Всего в области зарегистрировано 7 780 случаев ВИЧ-инфекции (48,1% от количества случаев в РБ), количество людей, живущих с ВИЧ – 5 619 человек (показатель распространённости 393 на 100 000 населения).

В эпидемический процесс вовлечены все административные территории, наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано:

- Светлогорский район – 3522;

- Жлобинский район – 1239;

- г. Гомель – 974;

- Речицкий район – 471;

- г. Мозырь – 329;

- Калининвичский район – 301;

- Октябрьский район – 242;

- Гомельский район – 151; в остальных районах от 11 до 86 случаев.

С момента регистрации ВИЧ-положительных с 1996 года и по состоянию на 01.04.2014г. в Речицком районе зарегистрировано 471 ВИЧ-положительный.

Из числа зарегистрированных 373 человека (79,2%) – жители города Речицы и 98 (20,8%) человек – жители сельской местности. В структуре заболеваемости 282 мужчин (59,9%) и 189 женщин (40,1%).

Путем заражения явились: инъекционное введение наркотических веществ – 42,5% (200 человек), половой – 56,1% (264 человека), в 1 случай (0,2%) путь передачи не установлен, в 4 случаях (0,9%) – вертикальным путем, 1 случай (0,2%) – нанесение татуировки нестерильным инструментарием.

В возрастной структуре заболеваемость распределяется: до 30 лет – 231 человека (49%), старше 30 лет – 240 человека (51%).

В структуре заболеваемости по социальному статусу: 285 чел. (60,5%) без определенного рода деятельности; 110 чел. (23,4%) рабочих и служащих.

**В Речицком районе за январь-март 2014 года выявлено 20 новых случая ВИЧ-инфекции (2013 год – 10).**

В структуре инфицированных ВИЧ: 12 мужчин (60%) и 8 женщин (40%).

В возрастной группе до 19 лет – 0 (0%), 20-24 года – 2 (10%), 25-29 лет – 2 (10%), 30-34 года – 3 (15%), **35-39 лет – 4 (20%)**, 40-44 года – 2 (10%), **45-49 лет – 4 (20%)**, 50-54 года – 1 (5%), 55-59 лет и старше – 2 (10%).

Преобладающим остается половой путь передачи: 20 человека (100%).

Городских жителей – 13 (65%), сельских – 7 (35%).

По социальному статусу: 11 (55%) – не работает, 6 (30%) – работающие, учащийся – 0 (0%), пенсионер – 1 (5%), СИЗО – 2 (10%) человека.

Всего в Речицком районе выявлено **5 ВИЧ-положительных детей**, случаев ВИЧ-инфекции среди детей в 2010-2011, 2013 годах не регистрировалось, в 2012 году – 1, за истекший период 2014 года – не регистрировалось.

В 2009-2010 годах аварийных ситуаций не регистрировалось (2008 год – 6 аварийных ситуаций), в 2011 году – 1 случай, за 2012 год – 3 случая, 2013 год – 1 случай, за истекший период 2014 года – не регистрировалось.

**Диагноз СПИД, пре-СПИД по состоянию на 01.04.2014г. установлен у 148 человек, что составляет 31,4% от числа зарегистрированных по Речицкому району. За январь-март 2014 года диагноз - 2 человека.**

Число умерших по состоянию на 01.04.2014г. составляет 129 человек, что составляет 27,4% от всех зарегистрированных по Речицкому району. За январь-март 2014 года – 6 человек.

## **Сегодня заразиться ВИЧ рискует каждый.**

Вирус иммунодефицита человека, попадая в организм, начинает разрушать иммунную систему.

СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, которая наступает через 8-10 лет, когда иммунная система разрушена, организм не может защищаться от болезней и человек умирает.

Пока же этого не произошло, человек чувствует себя хорошо, выглядит здоровым и может даже не подозревать, что у него ВИЧ, а, следовательно, передавать вирус другим людям.

**Лекарство от ВИЧ-инфекции не найдено.** Диагноз можно установить только по результатам лабораторного обследования.

## **ВИЧ передается тремя путями:**

- парентеральный (через кровь): человек может заразиться, используя нестерильные иглы, шприцы при инъекциях лекарственных средств, введении наркотиков, при непрофессиональном пирсинге, татуировках и т.д.;

- половой: заражение происходит при половом контакте (большое количество вируса содержится в сперме и влагалищных выделениях);

- вертикальный (от матери к ребенку): ВИЧ-инфицированная женщина может передать

инфекцию ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

### **Как защитить себя?**

Главное – позаботиться о том, чтобы в организм не попала инфицированная жидкость другого человека (кровь, сперма, влагалищные выделения):

- используйте стерильные инструменты при любых медицинских и косметических процедурах;

- откажитесь от употребления наркотиков;

- используйте презерватив при половых контактах, ведь до того как вы встретились, у Вас или Вашего партнера, возможно, была другая жизнь;

- если есть подозрения, обследуйтесь на ВИЧ, пройти обследование на ВИЧ можно в любой поликлинике по месту жительства бесплатно.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на интерактивном веб-сайте по проблеме ВИЧ/СПИД [www.aids.by](http://www.aids.by)