



В Речицкой районной больнице 12 ноября провели первую операцию при помощи метода интрамедуллярного блокированного остеосинтеза. В основе методики - стабилизация отломков кости специальными штифтами.

Закрытый интрамедуллярный остеосинтез [\(интерлокинг\)](#) с блокированием является стандартом лечения диафизарных переломов бедра и голени в большинстве развитых стран. Использование данного метода обеспечивает малотравматичную фиксацию переломов и позволяет более раннюю нагрузку конечности массой тела.

Вмешательство выполнили врач–травматолог-ортопед (заведующий) травматологического отделения, врач высшей категории Геннадий Георгиевич Колесников и врач-травматолог Алексей Дмитриевич Литвинюк. Чтобы овладеть данной методикой, Геннадий Георгиевич Колесников обучался в сентябре в Польше.

Главное преимущество этого метода - сокращенные сроки выздоровления и реабилитации. Уже на следующий день после вмешательства можно дозированно дать нагрузку на прооперированную ногу или руку. А к труду можно вернуться в 1,5 раза быстрее. К тому же теперь пациентам не надо носить гипс. Возможно, известная многим картина, когда больные с поломанными ногами месяцами лежат на скелетном вытяжении, для Речицы вскоре станет не актуальной.

В среднем ежемесячно в травматологическое отделение Речицкой районной больницы с переломами поступают 5-7 пациентов трудоспособного возраста.

