

Автор: Врач-эпидемиолог Речицкого ЗЦГЭ В.Лазакевич



На территории нашего района сибирская язва не регистрируется с 50-х годов XX века, когда было сделано 2 захоронения животных павших от этого заболевания. Данные захоронения находятся под пристальным надзором санитарной и ветеринарной служб по сей день, так как споры возбудителя сибирской язвы сохраняются в почве десятки лет. А при попадании в благоприятные условия могут активизироваться и вызвать заболевание.

На территории Российской Федерации насчитывается около 35 тысяч стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов с почвенными очагами, в которых учтено 7940 сибиреязвенных скотомогильников. За последние пять лет в России было зарегистрировано 43 случая заболевания людей сибирской язвой, из которых 3 было смертельных.

Сибирская язва — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата, интоксикацией, поражает кожные покровы, желудочно-кишечный тракт, легкие. Болеют сибирской язвой все млекопитающие животные и человек.

Источник бактерий сибирской язвы — больные или павшие животные (коровы, лошади, овцы, козы, свиньи). Заражение человека происходит при контакте с больным животным, разделке туш, обработке шкур и т.п., а так же возможно заражение при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, через воду, почву, меховые изделия и т. д. Возбудитель так же проникает в организм человека через микротравмы кожи, при употреблении в пищу зараженных продуктов или вдыхании инфицированной пыли и костной муки. В случае гибели животных от сибирской язвы туши животных должны сжигаться, а продукты питания, полученные от них, уничтожаться.

Характеризуется данное заболевание образованием язв на коже, которые распространяются и поражают обширные участки тела. Наблюдаются повышение температуры тела, слабость, сонливость, головная боль. При выздоровлении на коже

остаются глубокие рубцы. Могут так же поражаться легкие. При этом заболевание протекает очень тяжело и может заканчиваться летально. В случае поражения желудочно-кишечного тракта появляются боли в области желудка, понос, рвота и общая интоксикация. Пациент так же может погибнуть от инфекционно-токсического шока.

Профилактическим мерами является обнаружение и уничтожение очагов инфекции, вакцинация сельскохозяйственных животных и строгий контроль за местами захоронений животных, павших от сибирской язвы, запрет на проведение любых работ вблизи захоронений, исключение возможности проникновения людей в эти места. С целью предупреждения людей оба захоронения оснащены предостерегающими табличками с напоминанием о том, что от этих мест стоит держаться подальше.