

Автор: У «Речицкий зональный ЦГЭ»



Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться сложной и напряженной.

По данным официальной статистики в **Республике Беларусь** на 01.03.2013г. зарегистрировано 14663 случаев ВИЧ-инфекции. По-прежнему,

Гомельская область

занимает лидирующее положение. Всего в области зарегистрировано 7119 случаев ВИЧ-инфекции (48,6% от всех случаев в РБ). В эпидемический процесс вовлечены все административные районы области.

Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в следующих районах: Светлогорский – 3274, Жлобинский – 1141, г.Гомель – 893, **Речицкий** – 425, г.Мозырь – 293, Калинковичский – 272, Октябрьский – 226, Гомельский – 138. В остальных районах от 11 до 67 случаев.

С момента регистрации ВИЧ-положительных с 1996 года и по состоянию на 01.05.2013г. в Речицком районе зарегистрировано 425 ВИЧ-положительных.

Из числа зарегистрированных 343 (80,7%) – жители города Речицы и 82 (19,3%) человека – жители сельской местности. В структуре заболеваемости 253 мужчины (59,5%) и 172 женщины (40,5%). Путем заражения явились: инъекционное введение наркотических веществ – 46,8% (199 человек), половой – 52% (221 человек), в 1 случае (0,2%) путь передачи не установлен, в 4 случаях (1,0%) – вертикальным путем.

В возрастной структуре заболеваемость распределяется: до 30 лет – 223 человека (52,5%), старше 30 лет – 202 человека (47,5%).

В структуре заболеваемости по социальному статусу: 261 чел. (61,4%) без определенного рода деятельности; 97 чел. (22,8%) рабочих и служащих.

В Речицком районе за январь-апрель 2013 года выявлено 13 новых случаев (2012 год – 13).

В структуре инфицированных ВИЧ: 6 мужчин (46,2%) и 7 женщин (53,8%).

В возрастной группе до 19 лет – 1 (7,7%), 20-24 года – 1 (7,7%), 30-34 года – 2 (15,4%), 35-39 лет – 3 (23,1%), 40-44 года – 3 (23,1%), 45-49 лет – 2 (15,3%), 50-54 года – 1 (7,7%).

Преобладающим остается половой путь передачи: 12 человек (92,3%), инъекционные наркотики – 1 (7,7%).

Городских жителей – 11 (84,6%), сельских – 2 (15,4%).

По социальному статусу: 7 (53,8%) – не работают, 5 (38,5%) – работающие, 1 (7,7%) – учащийся.

Всего в Речицком районе выявлено 4 ВИЧ-инфицированных ребенка, случаев ВИЧ-инфекции среди детей в 2010-2011 годах не регистрировалось, в 2012 году – 1, в 2013 году – не регистрировалось.

В 2009-2010 годах аварийных ситуаций не регистрировалось (2008 год – 6 аварийных ситуаций), в 2011 году – 1 случай, за 2012 год – 3 случая, 2013 год – не регистрировалось.

Диагноз СПИД, пре-СПИД по состоянию на 01.05.2013г. установлен у 131 человека, что

составляет 30,8% от числа зарегистрированных по Речицкому району. За январь-апрель 2013 года – 14 человек.

Число умерших по состоянию на 01.05.2013г. составляет 107 человек, что составляет 25,2% от всех зарегистрированных по Речицкому району. За январь-апрель 2013 – 7 человек.

Сегодня заразиться ВИЧ рискует каждый.

Вирус иммунодефицита человека, попадая в организм, начинает разрушать иммунную систему.

СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, которая наступает через 8-10 лет, когда иммунная система разрушена, организм не может защищаться от болезней и человек умирает.

Пока же этого не произошло, человек чувствует себя хорошо, выглядит здоровым и может даже не подозревать, что у него ВИЧ, а, следовательно, передавать вирус другим людям.

Лекарство от ВИЧ-инфекции не найдено. Диагноз можно установить только по результатам лабораторного обследования.

ВИЧ передается тремя путями:

- парентеральный (через кровь): человек может заразиться, используя нестерильные иглы, шприцы при инъекциях лекарственных средств, введении наркотиков, при непрофессиональном пирсинге, татуировках и т.д.;
- половой: заражение происходит при половом контакте (большое количество вируса содержится в сперме и влагалищных выделениях);
- вертикальный (от матери к ребенку): ВИЧ-инфицированная женщина может передать инфекцию ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Как защитить себя?

Главное – позаботиться о том, чтобы в организм не попала инфицированная жидкость другого человека (кровь, сперма, влагалищные выделения):

- используйте стерильные инструменты при любых медицинских и косметических процедурах;
- откажитесь от употребления наркотиков;
- используйте презерватив при половых контактах, ведь до того как вы встретились, у Вас или Вашего партнера, возможно, была другая жизнь;
- если есть подозрения, обследуйтесь на ВИЧ, пройти обследование на ВИЧ можно в любой поликлинике по месту жительства бесплатно.