

В Республике Беларусь с 27 декабря 2021 г. началось проведение **вакцинации детей против COVID-19**.

Первоначально планируется сформировать защиту от новой коронавирусной инфекции среди детей, которые чаще других детей вовлекаются в эпидемический процесс. Коронавирус (SARS-CoV-2) опасен не только для взрослых. Заболевание детей также может протекать тяжело и требовать госпитализации. Кроме того, дети становятся источником инфекции для окружающих взрослых.

Согласно приказу №1044 Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.08.2022 "Инструкция о порядке проведения основной и бустерной вакцинации против COVID-19" **первичная вакцинация проводится для детей 5-17 лет двумя дозами вакцины Sinofarm**.

Для проведения прививок используется вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Vero), инактивированная, выпускаемая Пекинским институтом биологических препаратов (Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd., BIBP), Китайской национальной биотехнологической группы (China National Biotec Group (CNBG)), Sinopharm.

У Республики Беларусь уже накоплен определенный опыт применения данной вакцины у взрослых. С 7 мая 2021 г. вакцина включена в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ.

#### **Справочно:**

Вакцина создана на основе **инактивированного** цельного вируса (выращенного в клетках Vero), не содержит тканей человека, животных или фетальных тканей, **неживая**

, содержит гидроксид алюминия в качестве адъюванта (для усиления иммунного ответа организма). Курс вакцинации состоит из

**двух доз, которые вводятся с интервалом 21-28 дней**

. Если введение второй дозы вакцины задерживается более чем на 4 недели, то её следует ввести при первой же возможности.

По данным ВОЗ вакцина продемонстрировала достаточную эффективность в отношении предупреждения симптомной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, и госпитализации, начиная с 14 дня и далее после введения второй дозы.

**Введение вакцины противопоказано** при наличии в анамнезе анафилактической реакции на любой компонент вакцины или предыдущее ее введение. Отложить проведение вакцинации целесообразно до выздоровления при любом остром заболевании (лихорадочном состоянии) или обострении хронического заболевания.

Перед проведением прививки оформляется информированное согласие родителей (законных представителей) на проведение вакцинации. Разрешение на вакцинацию дается врачом после клинического осмотра ребенка и при отсутствии противопоказаний в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата.

Вакцинация проводится в соответствии с порядком, сформированным на каждой административной территории (в организациях здравоохранения, вне организаций здравоохранения (в медицинских кабинетах учреждений образования выездными прививочными бригадами в составе врача-специалиста и работника со средним специальным образованием).