Автор:Автор:В.Кохановская, заведующий отделом общественного здоровья ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



Каждому человеку, рано или поздно приходится испытать на себе не очень приятную, но иногда жизненно необходимую процедуру — укол. При множестве заболеваний без уколов просто не обойтись и зачастую многие думают о том, что проведение данной процедуры самостоятельно в домашних условиях дело не сложное и безопасное. Однако – это не так. Следует помнить, что самостоятельное проведение инъекций может привести к серьезным последствиям для организма. Нарушение правил антисептики, и как следствие – занесение инфекции в то место, куда вы делаете укол, может привести к таким осложнениям как:

• **инфильтрат**

– плотная болезненная шишка, образовавшаяся из-за плохо рассосавшегося лекарства, – наиболее распространенное осложнение после внутримышечной инъекции. Неточный выбор места инъекции, частые инъекции в одно и то же место, нарушение правил асептики являются основными причинами появления инфильтратов;

• **постинъекционный абсцесс**

– гнойное воспаление мягких тканей. Причины образования абсцессов те же, что и инфильтратов, а вот лечение уже более серьезное. Если от инфильтрата можно избавиться с помощью прогревания и физиотерапевтических процедур, то вот с абсцессом без помощи хирурга не справиться;

• **аллергия**

на укол может проявиться в виде крапивницы, острого насморка, острого конъюнктивита, отека Квинке (удушья), возникающего через 20-30 минут после введения препарата. Самая грозная форма аллергической реакции – анафилактический шок, который развивается в течение нескольких секунд или минут с момента введения лекарства.

Будьте внимательны к своему здоровью! Обращайтесь за медицинской помощью, в том числе, и за выполнением инъекций к медицинским работникам в медицинские учреждения.

ПОМНИТЕ!

Сделать инъекцию правильно может только квалифицированный специалист с медицинским образованием!